

واکسن های کووید 19: پرسش های متداول

مزایای واکسیناسیون کووید 19 چیست؟

واکسن زدن میتواند مانع از ابتلای شما به کووید 19 شود و همچنان میتواند از جامعه و فامیل تان در مقابل مریض شدن محافظت کند. واکسن زدن برای توقف همه گیری کووید 19 و بازگشت جوامع به حالت طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

واکسن های موجود کووید 19 کنونی کدامند؟

در حال حاضر، دو واکسن تأیید شده وجود دارد:

- واکسن کووید 19 بیون-تک-فایزر
- واکسن کووید 19 مدرنا

هر دوی این واکسن ها بسیار مؤثرند و به منظور حصول اطمینان از ایمن بودنشان برای عموم مردم، مطالعات و تحقیقاتی انجام شده است.

کی باید واکسینه شود؟

اشخاص 16 سال و بزرگتر میتوانند با واکسن بیون-تک-فایزر و اشخاص 18 سال و بزرگتر میتوانند با واکسن مدرنا واکسینه شوند.

چی وقت میتوانم واکسن بزنم؟

مین از روش مرحله به مرحله برای واکسیناسیون استفاده میکند. در حال حاضر، ما در مرحله اول هستیم. در این مرحله، کارکنان مراقبت های صحی، مسؤولان بخش ایمرجنسی، اشخاص مرتبط با امکانات کمک به زنده گی و اشخاص بالای 70 سال واکسینه میشوند. در مرحله بعدی اشخاص 65 تا 69 ساله و بزرگسالان مبتلا به مرض های طبی پر خطر واکسینه میشوند. احتمالاً واکسن برای عموم مردم در تابستان 2021 در دسترس باشد.

واکسن چگونه تزریق میشود؟

هر دو واکسن به صورت عضلانی تزریق میشوند و به دو دوز ضرورت دارند. برای واکسن بیون-تک-فایزر دوزها به فاصله دو هفته استفاده شوند. برای واکسن مدرنا، دوزها با فاصله یک ماه استفاده شوند.

مایلید در مورد واکسن کووید 19 معلومات بیشتری کسب کنید؟

سوالات خود را به این ایمیل بفرستید: C19vaccine.MECDC@maine.gov

قبل از واکسن زدن به مسئول واکسیناسیون باید چه بگویم؟

باید در مورد هر نوع مرض خود و در شرایط ذیل با ارائه‌دهنده خود صحبت کنید:

- داشتن آلرژی
- داشتن تب
- داشتن اختلال خونریزی یا مصرف دواى رقیق کننده خون
- داشتن نقص ایمنی یا مصرف دواىی که روی سیستم ایمنی بدن تاثیر می‌گذارد
- باردار بودن یا قصد بارداری داشتن
- در دوران شیردهی
- واکسن کووید 19 دیگری دریافت کرده باشید

آیا عوارض جانبی دارد؟ در صورت ابتلا به آن ها باید چکار کنم؟

ممکن است به برخی از عوارض جانبی خفیف واکسن دچار شوید. این یک واکنش نورمال است و طی چند روز از بین می‌رود. عوارض جانبی ممکن است مانند علائم کووید 19 (درد عضلانی، سردرد و لرز) باشد و احتمال بروز آنها بعد از دوز دوم بیشتر است. احتمال بروز عوارض جانبی شدید بسیار کم است.

در صورت بارداری یا شیردهی می‌توانم واکسن بزنم؟

باید در مورد انتخاب های خود با ارائه دهنده مراقبت های صحت یا کارکنان صحت جامعه صحبت کنید.

قبلاً به کووید 19 مبتلا شده‌ام، آیا باز هم باید واکسن بزنم؟

حتی در صورتی که قبلاً به کووید 19 مبتلا شده‌اید، توصیه می‌شود واکسن بزنید. پس از بهبودی از کووید 19 می‌توانید هرزمانی واکسن بزنید.

من دچار یک بیماری زمینه‌ای هستم، آیا واکسن برایم ایمن است؟ باید راجع به شرایط یا نگرانی های خود با ارائه دهنده مراقبت های صحت یا کارکنان صحت جامعه صحبت کنید تا ببینید آیا واکسن برایتان مناسب است یا خیر.

آیا واکسن مرا به کووید 19 مبتلا می‌کند؟

نخیر، این واکسن شما را به کووید 19 مبتلا نمی‌کند.

مایلید در مورد واکسن کووید 19 معلومات بیشتری کسب کنید؟

سوالات خود را به این ایمیل بفرستید: C19vaccine.MECDC@maine.gov

واکسن ها حاوی چی هستند؟

دو واکسن حاوی مواد تحریک کننده، مواد نگهدارنده یا لاتکس نیستند می‌توانید لیستی از مواد تشکیل دهنده را در اینجا پیدا کنید:

- واکسن بیونک-فایزر: <https://www.fda.gov/media/144414/download>
- واکسن مدرنا: <https://www.fda.gov/media/144638/download>

آیا هر دو دوز واکسن باید از یک تولیدکننده باشند؟

بله. دوزهای اول و دوم واکسن باید از یک تولیدکننده (پفایزر یا مدرنا) باشند. شما نمی‌توانید از هر کدام یکی بگیرید..

پس از دریافت دو دوز، آیا باز هم باید ماسک بزنم و فاصله اجتماعی را رعایت کنم؟

بله، حتی در صورت واکسینه شدن باید همچنان ماسک بزنید و از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید. مرکز کنترل و پیشگیری امراض مین هنوز معلومات کافی برای توقف الزام اشخاص به پیروی از پروتکل های ایمنی کووید 19 ندارد.

**مایلید در مورد واکسن کووید 19 معلومات
بیشتری کسب کنید؟**

سوالات خود را به این ایمیل بفرستید:

C19vaccine.MECDC@maine.gov